Wojciech Grabiński, Tadeusz Stawarczyk

KOLONIA KORMORANÓW /PHALACROCORAX CARBO/ W DOLINIE BARYCZY

Cormorant /Phalacrocorax carbo/ breeding colony in Barycz Valley

W roku 1984, we wschodniej części doliny Baryczy, na wyspie jednego ze stawów P.G.Ryb. "Potasznia" powstała duża kolonia kormoranów. Na początku maja wyspa, porośnięta olchami i usychającymi sosnami, zasiedlona została przez czaple siwe /Ardea cinerea/. W dniu 17 V obserwowaliśmy 1 parę kormoranów przebywającą w kolonii czapli liczącej wówczas 16 gniazd. 22 VI prócz 18 gniazd czapli, było już 27 gniazd kormoranów. Z tego 10 w trakcie budowy, a pozostałe były ukończone i co najmniej 12 ptaków wysiadywało jaja. Wokół kolonii krążyło około 80 kormoranów. W dniu 9 VII było już 46 gniazd kormoranów /3 gniazda były jeszcze w budowie - ptaki nosiły patyki/, podczas gdy liczba gniazd czapli wzrosła ostatecznie do 21. Pod wieloma gniazdami znaleźliśmy skorupy jaj świadczące o wykluciu się młodych kormoranów. W kilku gniazdach widać było duże, pokryte ciemnym puchem pisklęta, a nad wyspą krążyło około 120 ptaków. Większość gniazd /33/ zbudowały kormorany na sosnach, a pozostałe na olchach.

Tak duża kolonia kormoranów jest zjawiskiem nowym w dolinie Baryczy i na całym Śląsku. Wszystkie bowiem, dobrze udokumentowane, wcześniejsze informacje dotyczyły lęgów pojedynczych par /Pax 1925, Mrugasiewicz 1983/. Jest to jednocześnie najdalej na południe wysunięta kolonia lęgowa tego gatunku w Polsce /Przybysz et al. w druku/.

Literatura

Mrugasiewicz A., 1983. Kormoran /Phalacrocorax carbo/ znów gatunkiem lęgowym w dolinie Baryczy. Dolina Baryczy 2: 45-47.

Pax F., 1925. Wirbeltierfauna von Schlesien. Berlin.

Przybysz A., Przybysz J., Przybysz K., /w druku/. Materiały do występowania kormorana czarnego /Phalacrocorax carbo/ w Polsce. Acta Orn.

Summary

Fourty-six pairs of Phalacrocorax carbo started a new colony in the Barycz Valley in 1984. This is the first colony of that size in Silesia and the southernmost breeding place of this species in Poland.