

OBSERWACJA BIEGUSA PŁOWEGO (TRYNGITES SUBRUFICOLLIS) NA
ZBIORNIKU TURAWSKIM

27 VII 89 na Zbiorniku Turawskim obserwowaliśmy jednego biegusa płowego (KF 2825/89). Ptak żerował na wyschniętym kożuch z glonów w towarzystwie batalionów (*Philomachus pugnax*). Zauważono następujące cechy rozpoznawcze: wysmukła szyja; mała do brze wyodrębniona głowa; płowy, łuskowany grzbiet; ciemny ogon i żółte nogi.

Gatunek ten pojawia się w Polsce wyjątkowo. Dotychczas był on stwierdzony pięciokrotnie, w tym cztery obserwacje pochodzą z terenów Śląska (Tomiałojć 1990, Dyrzc i in., w druku). Na Zb. Turawskim biegus płowy widziany był dwukrotnie. Jedyne, poza Śląskiem, stwierdzenia dokonano w ujściu Redy nad Zatoką Pucką. W przypadku tej obserwacji zwraca uwagę wczesna data. Poprzednie stwierdzenia były dokonane w okresie IX-II.

Grzegorz Lorek, Dariusz Czaplicki

Literatura

- Dyrzc A., Grabiński W., Stawarczyk T., Witkowski J., w druku. Ptaki Śląska - monografia faunistyczna.
- Tomiałojć L. 1990. Ptaki Polski - rozmieszczenie i liczebność. Warszawa.

Observation of Buff-breasted Sandpiper at Turawa Reservoir

On 27th July 1989 one Buff-breasted Sandpiper was observed at Turawa Reservoir (Opole region). It is the sixth record of this species in Poland and fifth in Silesia. Observation accepted by the Faunistic Commission.